

# 予防接種の種類と受ける時期(2020年度)

種類	受ける時期	間隔・回数	料金	
定期 予 防 接 種	ロ タ	<ロタリックス> 生後6週0日～24週0日 ◆初回接種開始は、生後14週6日までに行うことが望ましい。	令和2年10月1日開始 27日以上の間隔をあけて2回 対象者：令和2年8月1日生～	無  料
		<ロタテック> 生後6週0日～32週0日 ◆初回接種開始は、生後14週6日までに行うことが望ましい。	令和2年10月1日開始 27日以上の間隔をあけて3回 対象者：令和2年8月1日生～	
	ヒ プ	初回免疫（1～3回目）：生後2か月以上5歳未満 ◆初回接種開始は生後2か月以上7か月未満が望ましい	27日（医師が必要と認めた場合は20日） 以上の間隔を置いて1歳未満に 3回	
		追加免疫：生後2か月以上5歳未満	初回免疫終了後7か月以上の間隔を置いて 1回	
	小児用 肺炎球菌	初回免疫（1～3回目）：生後2か月以上5歳未満 ◆初回接種開始は生後2か月以上7か月未満が望ましい	27日以上の間隔で 3回 ※ 生後12か月を超えて2回目を接種した場合は 3回目は行わない	
		追加免疫：1歳以上5歳未満 ◆1歳以上1歳3か月未満が望ましい	初回免疫終了後60日以上の間隔を置いて 1歳になってから 1回	
	B型肝炎	1歳未満	3回 ①（標準的には）生後2ヶ月以降 ② 1回目の接種から27日以後 ③ 1回目の接種から139日以後	
	4種混合	1期（1～3回目）：生後3か月以上7歳6か月未満 ◆1歳未満が望ましい	20日以上の間隔で 3回 ※標準的には56日までの間隔をおく	
	ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ	1期 追加：生後3か月以上7歳6か月未満 ◆1期3回目終了後12か月以上18か月未満が望ましい	1期3回目終了後6か月以上の間隔を置いて 1回	
		2期：11歳以上13歳未満（小学6年生が望ましい） ◆DT2種混合(ジフテリア・破傷風) ワクチンを接種します	1回	
	BCG	1歳未満 ◆5か月以上8か月未満が望ましい	1回	
	MR2種混合 麻しん 風しん	1期：1歳以上2歳未満	1回	
		2期：5歳以上7歳未満で小学校入学前1年間	1回 令和2年度対象者:H26.4.2～H27.4.1生 実施期間:R2.4.1～R3.3.31	
	日本脳炎	1期（1～2回目）：生後6か月以上7歳6か月未満 ◆3歳以上4歳未満が望ましい	6日以上の間隔で 2回	
		1期追加：生後6か月以上7歳6か月未満 ◆ 1期2回目終了後おおむね1年の間隔で、 5歳未満が望ましい	1期2回目終了後6か月以上の間隔で 1回	
2期：9歳以上13歳未満 ◆小学4年生が望ましい		1回 ※ 1期追加終了後、4～5年あけることが望ましい		
※特例対象者：平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方は、20歳未満であれば 済んでいない分の回数を無料で受けることができます。 ：平成19年4月2日から平成21年10月1日までに生まれた方は、9歳以上13歳未満の間に 済んでいない分の回数を無料で受けることができます。				
不活化 ポリオ	接種時期、間隔、回数は 4種混合 と同じです(2期はありません)			
子宮頸がん	1～3回目： 小学6年生～高校1年生に相当する年齢の女子 ◆中学1年生が望ましい	<サーバリックス> 3回 ①初回接種 ②初回接種から1か月後 ③初回接種から6か月後 <ガーダシル> 3回 ①初回接種 ②初回接種から2か月後 ③初回接種から6か月後		
水痘 (水ぼうそう)	1歳以上3歳未満 ◆1回目は1歳以上1歳3か月未満が望ましい	2回(3か月以上の間隔で) ※ 2回目は1回目終了後6か月以上12か月未満の 間隔をあけることが望ましい		
任 意 種 予 防	流行性 耳下腺炎 (おたふくかぜ)	1期：1歳以上2歳未満	1回	
		2期：5歳以上7歳未満で小学校入学前1年間	1回 令和2年度対象者:H26.4.2～H27.4.1生 実施期間:R2.4.1～R3.3.31	

※上記の予防接種は、すべて通年にわたって接種できます。ご不明な点は医療機関または健康増進課までお問合せ下さい。

※ロタウィルスワクチンが、令和2年10月1日（令和2年8月1日以降に生まれた子どもさん）から定期接種になります  
また、接種間隔の変更等が変更になった場合は、市のHPや「広報のべおか」等で、お知らせ致します。

